

Impfempfehlung

Platzhalter für Logo

Aufgrund Ihrer **chronischen Lungenerkrankung** sind Impfungen für Sie von besonderer Bedeutung. **Bitte wenden Sie sich dazu an Ihre Hausärztin/Ihren Hausarzt!**

Name, Vorname: _____ Geburtsjahr: _____

Erkrankung/Erreger	Impfempfehlung Erwachsene*	Geimpft?	
COVID-19	• Altersunabhängig	<input type="checkbox"/> Ja _____ Datum	<input type="checkbox"/> Nein → Impfen!
Pneumokokken (Lungenentzündung)	• Altersunabhängig	<input type="checkbox"/> Ja _____ Datum	<input type="checkbox"/> Nein → Impfen!
Herpes Zoster (Gürtelrose)	• Bei schwerer chronischer Lungenerkrankung ab 18 Jahren und bei allen Personen ab 60 Jahren	<input type="checkbox"/> Ja _____ Datum	<input type="checkbox"/> Nein → Impfen!
Influenza (Grippe)	• Altersunabhängig	<input type="checkbox"/> Ja _____ Datum	<input type="checkbox"/> Nein → Impfen!
RSV (Erkrankung der Atemwege)	• Bei schwerer chronischer Lungenerkrankung ab 60 Jahren und bei allen Personen ab 75 Jahren	<input type="checkbox"/> Ja _____ Datum	<input type="checkbox"/> Nein → Impfen!
Pertussis (Keuchhusten)	• Nächste fällige Td-Auffrischimpfung (alle 10 Jahre) einmalig als Tdap-Impfung verabreichen	<input type="checkbox"/> Ja _____ Datum	<input type="checkbox"/> Nein → Impfen!

Ich wurde zum Nutzen sowie den Risiken und Nebenwirkungen der oben genannten Impfung(en) durch meine Ärztin/meinen Arzt aufgeklärt und bin mit der Durchführung **einverstanden**

JA NEIN

Ort/Datum

Unterschrift

* Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) zu Impfungen bei chronischen Lungenerkrankungen (Epid. Bull 04/2026).

Wichtige Informationen

Für impfende Ärzt*innen

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege,

um Patient*innen mit chronischen Lungenerkrankungen entsprechend den aktuellen Empfehlungen der STIKO vor Infektionen zu schützen, bitten wir Sie um Überprüfung des Impfstatus und Ergänzung fehlender Indikationsimpfungen anhand der umseitigen Checkliste.

Alle empfohlenen Impfungen sind Totimpfstoffe und können auch bei immunsupprimierten Patient*innen angewandt werden. Prinzipiell können Totimpfstoffe gleichzeitig verabreicht werden; ein Mindestabstand zu anderen Impfungen ist in der Regel nicht erforderlich.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Unterschrift und Stempel der behandelnden Fachärztin / des behandelnden Facharztes

Für Patient*innen

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

aufgrund Ihrer Lungenerkrankung bzw. Ihrer Therapie sind Sie einem erhöhten Risiko für Infektionen und damit verbundenen schweren Verläufen ausgesetzt. Dieses Risiko kann durch Impfungen minimiert werden.

Deshalb empfehlen wir Ihnen sich mit Ihrer Hausärztin/Ihrem Hausarzt in Verbindung zu setzen, um rechtzeitig die wichtigen Impfungen durchzuführen.

Alle empfohlenen Impfungen sind Totimpfstoffe und können auch bei immunsupprimierten / immungeschwächten Patient*innen angewandt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Hausärztin/Ihrem Hausarzt.